

Knoevels Lammetjesmelkpoeder

Wat is het?

Lammetjesmelkpoeder is een van de best vevangende babymelken die kan worden toegediend aan babycavia's die geen of onvoldoende melk binnenkrijgen. Koffiemelk of kittenmelk is vaak te vettig en daar kunnen de darmpjes van een kleine cavia heftig op reageren, waardoor ze diarree krijgen. Dit is levensgevaarlijk, zeker voor zulke kleine caviaatjes. Koemelk is ook niet geschikt in verband met het vet- en eiwitgehalte.

Wanneer gebruik ik het?

Lammetjesmelk wordt gegeven aan babycavia's van 0-4 weken oud, wanneer zij niet of onvoldoende drinken. Dit kan komen omdat de moeder na de bevalling is overleden, omdat de moeder onvoldoende melk geeft of omdat de baby's zelf niet willen drinken. Pasgeboren baby's zijn erg zwak en hebben de grootste overlevingskans als zij in ieder geval binnen 24 uur na de geboorte de nog echte moedermelk hebben kunnen drinken.

Hoe gebruik ik het?

Lammetjesmelk dient met lauwwarm water te worden aangemengd tot een mooie melk ontstaat, de verhouding is ongeveer 1 deel poeder op 7 delen water. Het water wordt opgezogen in bij voorkeur een 1ml doseerspuitje en in zéér kleine hoeveelheden in het bekje van de baby te worden toegediend. Probeert u altijd, voor zover mogelijk, naar de wang van de baby te richten en niet in de keel. Het gevaar van verslikken is bij baby's erg groot.

De eerste dagen dient u liefst ieder uur (ook 's nachts zo regelmatig mogelijk een beetje melk aan te bieden, 0,5ml tot 1ml per keer is een mooie hoeveelheid. De hoeveelheid dient langzaam meer te worden, u kunt de melk onbeperkt aanbieden als de baby het blijft drinken. Bij wat grotere baby's kan ongeveer 2-3ml per keer worden gegeven.

Als de baby's goed groeien en zelfstandiger zijn, kunt u door de aangemaakte lammetjesmelk ook Brinta en/of Science Recovery mengen om een papje te maken waar de baby's zelfstandig van kunnen eten.

Tips

Lammetjesmelk is een zeer goede vervanger van moedermelk, maar niets kan het winnen van échte caviamelk. Indien u de mogelijkheid heeft, adviseren wij ook altijd om, in het geval van weesjes, eerst te kijken of u de baby('s) kunt aanleggen bij een pleegmoeder: een cavia die al een nestje heeft, met wat minder jongen, of waarvan de jongen groot genoeg zijn om bij de moeder weg te mogen. Zet de jongen in een zeer kleine ruimte samen met de pleegmoeder: hiermee is de kans op acceptatie het grootst.

Als u slechts een of twee jongen in een groter nest heeft die steeds door hun broertjes/zusjes worden weggeduwd in het nest, adviseren wij u om zeer regelmatig voor ca. 10-15 minuten de sterkste baby's bij de moeder weg te halen, zodat de kleinere baby's rustig de kans krijgen om bij haar te drinken.

Na het voeren van baby's zonder (pleeg)moeder, dient u met een wattenstaafje gedrenkt in lauwwarm water zachtjes het gebied rond het geslachtsdeel te masseren, om de darmpjes te stimuleren. Vaak volgt hierop snel een plasje of een beetje ontlasting. Normaal likt de moeder de baby's rond dit gebied ter stimulatie, maar zonder moeder dient de eigenaar deze taak de eerste weken over te nemen.

